

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CONTATO

O uso de algumas drogas interferem no resultado do teste e devem ser suspensas pelo período indicado. No caso de impossibilidade da suspensão do uso desses medicamentos, o teste não deverá ser aplicado, pois aumentará as chances de resultado falso- negativo:

Antialérgicos – 7 dias - (Inclusive antialérgicos em associação com outras drogas, como no caso de antigripais e antialérgicos tópicos, como Livostin, Rino-Azetin ou Rino-Lastin).

Cimetidina e Ranitidina – 2 dias- São remédios usados para tratamento de gastrite e outros problemas de estômago.

Corticóides sistêmicos (Decadron, Celestone, Meticorten, Calcort) - quando o paciente os está utilizando há mais de 10 dias, esperar 30 dias após a suspensão. Se o uso for menor do que 7 dias, não há necessidade de se aguardar esse tempo.

Algumas drogas usadas em psiquiatria- 10 dias

Imipramina

Fenotiazina

Clorpromazina (Amplictil)

Drogas antiasmáticas – 2 dias

Broncodilatadores de longa duração (salmeterol e formoterol) – 2 dias.

Outros medicamentos de uso contínuo, como hipoglicemiantes orais, insulina, anti-hipertensivos, não citados acima, não interferem nos resultados.

Não utilize nenhum creme no local no dia e após a aplicação.

A aplicação dos adesivos é feita no dorso superior. Por 48 horas o local precisa ser mantido seco.

Evite atividade física que possa provocar suor excessivo.

É possível que durante a exposição às substâncias alguma(s) provoquem leve prurido ou ardor.

Evite coçar. Após a retirada o processo deve ser descontinuado.

Após a primeira leitura apenas evitar o uso de cremes e pomadas no local e procure lavar apenas com água.

Após a última leitura não haverá necessidade de nenhum outro cuidado.

Lembrando que será feita uma leitura após 48 da aplicação e uma última 96h após a aplicação

Assista ao tutorial explicando como é feito o teste <https://www.youtube.com/watch?v=rmG56p4ji2w>

Em caso de dúvida, faça contato com seu médico ou farmacêutico.